

Naam van de patiënt (et op! Ponsplaatje of identiteitsbewijs meenemen)

Naam patiënt en Voorletters:

Geboortedatum:

BSN nummer:

tbv thuisprikken

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Evt. Sleuteladres:

 AMBULANT  KLINISCHWij staan voor u klaar op alle prikposten van Medlon, voor aanvragen van huisarts, specialist en trombosedienst! Voor openingstijden zie [www.medlon.nl](http://www.medlon.nl)

Telefoon	Fax thuisprikken
088 - 463 35 66	Regio Enschede 088 - 463 34 40
	Regio Almelo 088 - 463 36 30
	Regio Hengelo 088 - 463 36 20

## 1. Algemeen onderzoek

- Bezinking  
 Hb, MCV, vervolgonderzoek(1)  
 Glucose (niet nuchter)  
 TSH, indien afwijkend fT4  
 eGFR (2)

## 2. Anemie

- Diagnostiek  
 Hb, MCV, vervolgonderzoek(1)

## Controle

- Hb, MCV

## 3. Ontstekingsparameters

- CRP, leukocyten, neutrofielen

## 4. Nieraandoening

- eGFR (2)  
 Alb/kreatinine ratio in urineportie(6)  
 Urinescreening  
 Metabole complicaties (Hb, kalium, calcium, albumine, fosfaat, PTH)

## 5. Leveraandoeningen / Icterus

- ALAT, gGT, bilirubine  
 Bilirubine (neonatale icterus)

## 6. Cardiale klachten, Hartfalen

- hs Troponine T  
 NT-proBNP

## Comorbiditeit atriumfibrilleren, hartfalen

- Hb, glucose, TSH indien afw. fT4  
 CRP, leukocyten, differentiatie, ALAT, gGT, lipidenprofiel

## 7. Schildklierandoeningen

- Diagnostiek  
 TSH, indien afw. fT4  
  
 therapiecontrole  
 TSH, fT4

## hypo-hyperthyreoïdie

- Bezinking, leukocyten, fT4  
 anti-TSH-receptor antistoffen

## 8. psychogeriatric / Delier

- CRP, Hb, glucose, eGFR (2), TSH, indien afw fT4  
 Urinescreening  
 Natrium, kalium, eGFR (2)  
 Calcium, albumine  
 ALAT, gGT  
 Vit B1, vit B6, foliumzuur, actief vit B12

## 9. Osteoporose

- Vitamine D  
 Calcium, albumine, eGFR (2), TSH, bezinking, vitamine D, AF  
 Testosteron (indien man < 70 jr)

## 10. Diep veneuze trombose

- D-dimeer

## 11. Bloedingsneiging

- PT, APTT, trombocyten  
 controle orale antistolling (PT-INR), zie 16.

## 12. Coeliakie

- anti-tTGA, IgA

## 13. Atopie / allergie

- Inhalatie screening, indien afw. uitsplitsing (4)  
 Specifieke allergenen:

## 14. Artritis

- Jichtartritis  
 Urinezuur  
 eGFR (2), ALAT

## 15. Prostaat-en mictieklachten

- Urinescreening  
 eGFR (2)  
 Totaal PSA, indien afw. (4-10 µg/l) vrij PSA

## 16. Geneesmiddelen therapie

- Lithium  
 Lithium (12 uur na inname)  
 Lithium, TSH, eGFR (2) (2x p.j. 12 uur na inname)

## Diuretica, RAS inhibitor

- Natrium, kalium, eGFR (2)

## Digoxine

- Digoxine (vlak voor inname)  
 Kalium

## Vitamine K antagonisten

- PT-INR

Voor overige geneesmiddelen, zie formulier klinisch-farmaceutisch en toxicologisch onderzoek

## 17. Overige onderzoeken

- 

MEDLON

MEDISCHE DIAGNOSTIEK

door arts in te vullen

(Verpleeg)instelling d.d.: ...

Aanvrager

Kopie aan

Telefoon

Fax

 Uitslag dezelfde dag doorbellen/faxen Nuchter Thuisprikken binnen 3 dagen na d.d.: \_\_\_\_\_ op specifieke d.d.: \_\_\_\_\_

## CHRONISCHE ZORG

## Diabetes Mellitus

- Diagnose  
 Glucose (nuchter)  
 Glucose (niet nuchter)

## Controle nieuwe patiënt

- HbA1c, Glucose (nuchter), eGFR (2), Natrium, Kalium, ALAT, gGT, Hb, MCV, Lipidenprofiel, Alb/Kreatinine ratio in urineportie(6)

## Kwartaalcontrole

- Glucose (nuchter)  
 HbA1c

## Jaarcontrole

- HbA1c, glucose (nuchter), eGFR (2), Natrium, Kalium, lipidenprofiel, Alb/Kreatinine ratio in urineportie(6)

## Vasculair Risico Management

- Risicoschatting  
 Lipidenprofiel, eGFR(2), glucose (nuchter)

## Controle hypertensie

- Natrium, kalium, eGFR (2), Alb/Kreatinine ratio in urineportie(6)

## Controle hypercholesterolemie

- Lipidenprofiel  
 Creatine Kinase, ALAT (op indicatie bij statine)

Bij hyperlipidemie dienen secundaire oorzaken te worden uitgesloten

## bariatrie

- Jaarcontrole na bariatrische chirurgie

Nummers (1) tot en met (7) staan op de achterzijde van dit formulier uitgelegd bij Toelichting.

Sneller &gt; Beter &gt; Dichterbij

De scope van Medlons  
 accreditatie is gepubliceerd  
 op [www.rva.nl](http://www.rva.nl)



huisartsenlaboratoria  
 trombosediensten  
 ziekenhuislaboratoria

M-code



altijd invullen indien deze zijde gefaxt wordt

Naam patiënt en Voorletters: \_\_\_\_\_

Geboortedatum: \_\_\_\_\_

BSN nummer: \_\_\_\_\_

tbv thuisprikken

Adres: \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_

Woonplaats: \_\_\_\_\_

Telefoon: \_\_\_\_\_

Evt. Sleuteladres: \_\_\_\_\_

Openingstijden laboratoria en prikposten: www.medlon.nl

door arts in te vullen

Aanvrager \_\_\_\_\_

Kopie aan \_\_\_\_\_

Telefoon \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

 Uitslag dezelfde dag doorbellen/faxen Nuchter Thuisprikken binnen 3 dagen na d.d.: \_\_\_\_\_ op specifieke d.d.: \_\_\_\_\_onderzoeken in bloed

- ALAT  
 Albumine  
 Alkalische Fosfatase  
 Amylase  
 Apo-B  
 ASAT  
 AST  
 Bezinking  
 Bilirubine totaal, indien afw. directe bili  
 Bilirubine (neonataal)  
 CA125  
 Calcium  
 CD-tect  
 CEA  
 Chloride  
 Cholesterol totaal  
 Creatine Kinase  
 CRP  
 D-Dimeer  
 Digoxine (vlak voor inname)  
 eGFR (2)  
 Eiwit totaal  
 Ethanol  
 Ferritine  
 Foliiumzuur  
 Fosfaat  
 gGT  
 Glucose (niet nuchter)  
 Glucose (nuchter)  
 Haptoglobine  
 HbA1c  
 Hemochromatose screening  
 IJzer status (ijzer, transferrine, ferritine)  
 Kalium  
 Kreatinine  
 LD  
 Lipidenprofiel (TC, LDL, HDL, TG, TC/HDL, non-HDL)  
 Lipidenprofiel, diagnostisch (Lipidenprofiel + ApoB)  
 Lithium  
 Magnesium  
 Methylmalonzuur

- Natrium  
 NT-proBNP  
 PSA, indien afw. vrij PSA (4-10 µg/l)  
 hs Troponine T  
 Urinezuur  
 Ureum  
 Vitamine B1  
 Vitamine B12, actief  
 Vitamine B12, actief (indien afw Methylmalonzuur)  
 Vitamine B6  
 Vitamine D

Hematologie

- Hb  
 Hb, Ht, erythrocyten, indices  
 Hb, MCV, indien afw. vervolgonderzoek  
 Hb typering (abn Hb/thalassemie)  
 Reticulocyten  
 Leukocyten totaal  
 Leukocyten totaal, neutrofielen  
 Leukocyten totaal, differentiatie  
 Eosinofiele granulocyten  
 Trombocyten  
 Bloedgroep/Rhesus/irregulaire antistoffen  
 Malaria (zie aanvraagformulier malariadiagnostiek, niet op prikpost)

Stollingsonderzoek:

- APTT screening  
 PT screening  
 PT-INR (indien coumarine gebruik)  
 Fibrinogeen  
 Factor V Leiden  
 Trombofilie onderzoek

endocrinologie

- Cortisol (in serum)  
 TSH  
 fT4  
 anti-Mullerian Hormoon (AMH)  
 FSH  
 LH

- hCG  
 Oestradiol  
 Progesteron  
 Prolactine  
 PTH  
 Testosteron

immunologie/allergie

- anti-tTG, IgA  
 anti-TPO  
 anti-TSH receptor antistoffen  
 ANA  
 RA - anti-CCP (5)  
 RA - Reumafactor  
 HLA-B27  
 Hepatitis B (vaccinatie controle)  
 M-proteïne  
 Immunoglobulines (IgA, IgG, IgM)  
 IgE  
 Coeliakie screening familie 1e graad (HLA-DQ2/-DQ8, indien aanwezig: serologie)  
 Allergieonderzoek, Inhalatie screening (4)  
 Allergieonderzoek, specifieke allergenen:

onderzoeken in urine

(verzamel materiaal halen bij prikposten)

- Kreatinine klaring per 24 uur (7)  
 Albumine / kreatinine ratio (urineportie) (6)  
 Totaal eiwit per 24 uur (7)  
 Urinescreening  
 Urinesediment (Cylinders) (3)

onderzoeken in feces

(verzamel materiaal halen bij prikposten)

- Calprotectine  
 iFOBT  
 Elastase

donoronderzoek

- Nazorg aan altruïstische donor

Toelichting

- (1) Op geleide van Hb en MCV wordt gericht aanvullend onderzoek gedaan, tenminste: Nuchter: Vanaf 22.00 uur niet meer eten en drinken, behalve water en medicijnen. Diabeten volgens voorschrift van uw arts. Na bloedafname mag u weer eten.  
 Microcytair: ferritine, zo nodig Hb-typering  
 Normocytair: ferritine, leucocyten, trombocyten, reticulocyten, LD, kreatinine, ijzerstatus  
 Macrocytair: foliumzuur, actief vit B12, reticulocyten, LD, leucocyten, trombocyten
- (2) eGFR = geschatte GFR berekend mbv MDRD formule obv plasma kreatinine
- (3) Beperkt stabiel: alleen in verse geproduceerde urine op poli bloedafname MST of ZGT mogelijk
- (4) Indien pos., uitsplitsing in: Huisstofmijt, Kattenepitheel/roos, Hondenroos, Handjesgras, Timoteegras, Penicillium notatum, Alternaria tenuis, Ruwe berk, Japanse ceder, Alsem ambrosia, Smalle weegbree, Groot glaskruid
- (5) De specificiteit van anti-CCP is aanmerkelijk beter bij een sensitiviteit vergelijkbaar met Reumafactor. Bij verdenking RA is verwijzing geïndiceerd.
- (6) Urineportie: Bij voorkeur direct na het opstaan eerst een kleine hoeveelheid uitplassen, dan een deel opvangen in een urinepotje. Voor nieuwe urinepotjes kunt u terecht bij uw arts, een van onze prikposten of poli bloedafnames.
- (7) 24 uren urine: Voor het verzamelen van 24 uren urine kan een urinebokaal en instructie worden opgehaald bij prikposten of poli bloedafnames.

Voor openingstijden van de Medlon prikposten, zie www.medlon.nl

Relevante klinische gegevens en opmerkingen

M-code