

Naam van de patiënt (let op! Ponsplaatje of identiteitsbewijs meenemen)

Naam patiënt en Voorletters:

Geboortedatum:

BSN nummer:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:



door arts in te vullen

(Verpleeg)instelling d.d.: ...

Aanvrager

Kopie aan

Telefoon

Fax

Uitslag dezelfde dag doorbellen/faxen

Wij staan voor u klaar op alle prikposten van Medlon, voor aanvragen van huisarts, specialist en trombosedienst! U kunt een afspraak maken via www.medlon.nl op een locatie en tijdstip naar keuze. Daarvoor is alleen een naam, geboortedatum, telefoonnummer en een e-mailadres nodig.

Telefoon
088 - 463 35 66

fax thuisprikken
 Regio Enschede 088 - 463 34 40
 Regio Almelo 088 - 463 36 30
 Regio Hengelo 088 - 463 36 20

thuisprikken
 Nuchter
 Binnen 3 dagen na d.d.:
 Op specifieke d.d.:

mediant

klinisch
 ambulantly

PROFIELCODE

- OpnV
- Opn50
- Ondervoeding
- Organiciteit
- Alcoholabusus
- Drugtest
- Seksueel risicogedrag
- CVR
- Stollingsst.
- EPA-J
- ContrAP
- Clo-Vostart
- Clo-1e18WeWe+4We
- Clo-1e3MaMa
- Clo-3ma+Per
- Clo-6ma+per
- SteSta-Vostart
- Li-per
- Val-per
- Lam-per
- Car-per
- Car-jaar
- Li-instel
- Phamous

indicatie

- Opname Kliniek Volwassenen
- Opname Kliniek 50 plus
- Ondervoeding/verwaarlozing
- Verdenking op organiciteit (inclusief dementie)
- Vermoeden van overmatig alcoholgebruik
- Parenteraal druggebruik
- Seksueel risicogedrag
- Evaluatie cardiovasculair risico
- Verdenking op stollingsstoornis
- EPA-Jaarlyks nuchter
- Voor Start AntiPsychotica en na 6, 12 en 52 weken
- Clozapine vóór start
- Clozapine-eerste 18 weken wekelijks, daarna vierwekelijks
Tevens indien clozapine-gebruik werd onderbroken, in frequentie volgens richtlijnen
- Clozapine eerste 3 maanden maandelijks
- Clozapine na 3 maanden en daarna jaarlijks
- Clozapine na 6 maanden en daarna jaarlijks
- Vóór start met lithium, valproïnezuur, carbamazepine, lamotrigine of antipsychoticum als StemningsStabilitor
- Periodieke controle bij Lithiumgebruik
- Periodiek bij Valproïnezuur gebruik na 3 mnd, daarna jaarlijks
- Periodiek bij Lamotrigine gebruik na 3 mnd, daarna jaarlijks
- Carbamazepine na 1 maand, na 2 maand, na 3 maand
- Carbamazepine jaarlijks
- Li-instel
- Phamous



altijd invullen indien deze zijde gefaxt wordt

Naam patiënt en Voorletters: _____

Geboortedatum: _____

BSN nummer: _____

door arts in te vullen

(Verpleeg)instelling _____ d.d.: ...

Aanvrager _____

Kopie aan _____

Telefoon _____

Fax _____

Uitslag dezelfde dag doorbellen/faxen

thuisprikken

Nuchter

Binnen 3 dagen na d.d.:

Op specifieke d.d.:

Openingstijden laboratoria en prikposten: www.medlon.nl

individuele onderzoeken in bloed

- ALAT
- Albumine
- Alkalische Fosfatase
- Amylase
- ASAT
- AST
- Bezinking
- Bilirubine totaal, indien afw. directe bili
- Bilirubine (neonataal)
- CA125
- Calcium
- CD-tect
- CEA
- Chloride
- Cholesterol totaal
- Creatine Kinase
- CRP
- D-Dimeer
- Digoxine
- eGFR (2)
- Eiwit totaal
- Ethanol
- Ferritine
- Foliuimzuur
- Fosfaat
- gGT
- Glucose (niet nuchter)
- Glucose (nuchter)
- Haptoglobine
- HbA1c
- Hemochromatose screening
- IJzer status (ijzer, transferrine, ferritine)
- Kalium
- Kreatinine
- LD
- Lipidenprofiel (TC, LDL, HDL, TG, TC/HDL)
- Lithium
- Magnesium
- Methylmalonzuur

- Natrium
- NT-proBNP
- PSA, indien afw. vrij PSA
- hs Troponine T
- Urinezuur
- Ureum
- Vitamine B1
- Vitamine B12, actief
- Vitamine B12, actief (indien afw Methylmalonzuur)
- Vitamine B6
- Vitamine D

hematologie

- Hb
- Hb, Ht, erythrocyten, indices
- Hb, MCV, indien afw. vervolgonderzoek
- Hb typering (abn Hb/thalassemie)
- Reticulocyten
- Leukocyten totaal
- Leukocyten totaal, neutrofielen
- Leukocyten totaal, differentiatie
- Eosinofiele granulocyten
- Trombocyten
- Bloedgroep/Rhesus/irregulaire antistoffen
- Malaria (zie aanvraagformulier malaradiagnostiek, niet op prikpost)

stollingsonderzoek

- APTT screening
- PT screening
- PT-INR (indien coumarine gebruik)
- Fibrinogeen
- Factor V Leiden
- Trombofilie onderzoek

endocrinologie

- Cortisol (in serum)
- TSH
- fT4

- anti-Mullerian Hormoon (AMH)
- FSH
- LH
- hCG
- Oestradiol
- Progesteron
- Prolactine
- PTH
- Testosteron

immunologie/allergie

- anti-TTG, IgA
- anti-TPO
- anti-TSH receptor antistoffen
- ANA
- RA - anti-CCP (5)
- RA - Reumafactor
- HLA-B27
- Hepatitis B (vaccinatie controle)
- M-proteïne
- Immunoglobulines (IgA, IgG, IgM)
- IgE
- Coeliakie screening familie 1e graad (HLA-DQ2/-DQ8, indien aanwezig: serologie)
- Allergieonderzoek, Inhalatie screening (4)
- Allergieonderzoek, specifieke allergenen: _____

onderzoeken in urine

- (verzamel materiaal halen bij prikposten)
- Kreatinine klaring per 24 uur (7)
- Albumine/kreatinine ratio (urineportie) (6)
- Totaal eiwit per 24 uur (7)
- Urinescreening
- Urinesediment (Cylinders) (3)

onderzoeken in feces

- (verzamel materiaal halen bij prikposten)
- Calprotectine
- iFOBT
- Elastase

toelichting

- (2) eGFR = geschatte GFR berekend mbv MDRD formule obv plasma kreatinine.
- (3) Beperkt stabiel: alleen in verse geproduceerde urine op poli bloedafname MST of ZGT mogelijk.
- (4) Indien pos., uitsplitsing in: Huisstofmijt, Kattenepitheel/roos, Hondenroos, Handjesgras, Timoteegras, Penicillium notatum, Alternaria tenuis, Ruwe berk, Japanse ceder, Alsem ambrosia, Smalle wegbree, Groot glaskruid.
- (5) De specificiteit van anti-CCP is aanmerkelijk beter bij een sensitiviteit vergelijkbaar met Reumafactor. Bij verdenking RA is verwijzing geïndiceerd.
- (6) Urineportie: Bij voorkeur direct na het opstaan eerste een kleine hoeveelheid uitplassen, dan een deel opvangen in een urinepotje. Nieuwe urinepotjes kunt u bestellen op bestellen.medlon.nl
- (7) 24 uren urine: Voor het verzamelen van 24 uren urine kan een urinebokaal en instructie worden opgehaald bij prikposten of poli's bloedafnames.

relevante klinische gegevens/opmerkingen en overige onderzoeken

nuchter: Vanaf 22.00 uur niet meer eten en drinken, behalve water en medicijnen. Diabeten volgens voorschrift van uw arts. Na bloedafname mag u weer eten.

Paraaf

Lichaamsmateriaal dat na analyse overblijft kan voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. Dit gebeurt op anonieme wijze, dat wil zeggen dat niet meer kan worden nagegaan van wie het materiaal afkomstig is. Indien u bezwaar heeft tegen het nader gebruik van lichaamsmateriaal, kunt u dit melden bij de laboratoriummedewerker