

NAAM VAN DE PATIËNT (let op! Identiteitsbewijs meenemen)

Naam patiënt: _____

Geboortedatum: _____

BSN nummer: _____

DOOR ARTS IN TE VULLEN

(Verpleeg)instelling: _____ d.d.: _____

Aanvrager: _____

Kopie aan: _____

Telefoon: _____

- Uitslag dezelfde dag doorbellen naar:
 Nuchter
 Thuisprikken (*postcodetabel: www.unilabs.nl/thuisprikken/)
 Eerst volgende vrije prikmoment volgens de postcodetabel*
 In de week van (niet huidige week, gepland middels postcode

Tabel*): _____

- Op d.d. (uitsluitend bij MEDISCHE NOODZAAK)
 Klinisch
 Ambulant

MEDIANT
PROFIELCODE

- OpnV
 Opn50
 Ondervoeding
 Organiciteit
 Alcoholabusus
 Drugtest
 Seksueel risicogedrag
 CVR
 Stollingsst.
 EPA-J
 Clo-Vostart
 Clo-1e18WeWe+4We

- Clo-1e3MaMa
 Clo-3ma+Per
 Clo-6ma+per
 SteSta-Vostart
 Li-per
 Val-per
 Lam-per
 Car-per
 Car-jaar
 Li-instel
 Phamous

INDICATIE

- Opname Kliniek Volwassenen
 Opname Kliniek 50 plus
 Ondervoeding/verwaarlozing
 Verdenking op organiciteit (inclusief dementie)
 Vermoeden van overmatig alcoholgebruik
 Parenteraal druggebruik
 Seksueel risicogedrag
 Evaluatie cardiovasculair risico
 Verdenking op stollingsstoornis
 EPA-Jaarlijks nuchter
 Voor Start AntiPsychotica en na 6, 12 en 52 weken
 Clozapine-eerste 18 weken wekelijks, daarna vierwekelijks.
 Tevens indien clozapine-gebruik werd onderbroken, in frequentie volgens richtlijnen
 Clozapine eerste 3 maanden maandelijks
 Clozapine na 3 maanden en daarna jaarlijks
 Clozapine na 6 maanden en daarna jaarlijks
 Vóór start met lithium, valproïnezuur, carbamazepine, lamotrigine of antipsychoticum als StemningsStabilisator
 Periodieke controle bij Lithiumgebruik
 Periodiek bij Valproïnezuur gebruik na 3 mnd, daarna jaarlijks
 Periodiek bij Lamotrigine gebruik na 3 mnd, daarna jaarlijks
 Carbamazepine na 1 maand, na 2 maand, na 3 maand
 Carbamazepine jaarlijks
 Li-instel
 Phamous

NAAM VAN DE PATIËNT (let op! Identiteitsbewijs meenemen)

altijd invullen indien deze zijde gefaxt wordt

DOOR ARTS IN TE VULLEN

Naam patiënt en Voorletters: _____

(Verpleeg)instelling: _____ d.d.: _____

Geboortedatum: _____

Aanvrager: _____

BSN nummer: _____

Kopie aan: _____

TBV THUISPRIKKEN

Adres: _____

 Uitslag dezelfde dag doorbellen
 Nuchter
 Thuisprikken (*postcodetabel: www.unilabs.nl/thuisprikken/)

Postcode: _____

 Eerst volgende vrije prikmoment volgens de postcodetabel*
 In de week van (niet huidige week, gepland middels postcode

Woonplaats: _____

Tabel*): _____

Telefoon: _____

 Op d.d. (uitsluitend bij MEDISCHE NOODZAAK)

Evt. Sleuteladres: _____

ONDERZOEKEN IN BLOED

-
- ALAT
-
-
- Albumine
-
-
- Alkalische Fosfatase
-
-
- Amylase
-
-
- Apo-B
-
-
- ASAT
-
-
- AST
-
-
- Bezinking
-
-
- Bilirubine totaal, indien afw. directe bilirubine
-
-
- Bilirubine (neonataal)
-
-
- CA125
-
-
- Calcium
-
-
- CD-tect
-
-
- CEA
-
-
- Chloride
-
-
- Cholesterol totaal
-
-
- Creatine Kinase
-
-
- CRP
-
-
- Cystatine C (plus eGFR
- _{Cys}
- berekening)
-
-
- D-Dimeer

Indien verhoogd doorbellen op 06.....(8)

-
- Digoxine (vlak voor inname)
-
-
- eGFR (2)
-
-
- Eiwit totaal
-
-
- Ethanol
-
-
- Ferritine
-
-
- Foliuimzuur
-
-
- Fosfaat
-
-
- gGT
-
-
- Glucose (niet nuchter)
-
-
- Glucose (nuchter)
-
-
- Haptoglobine

-
- HbA1c
-
-
- Hemochromatose screening
-
-
- IJzer status (ijzer, transferrine, ferritine)
-
-
- Kalium
-
-
- Kreatinine
-
-
- Lactose-intolerantie gen onderzoek
-
-
- LD
-
-
- Lipidenprofiel (TC, LDL, HDL, TG, TC/HDL, non-HDL)
-
-
- Lipidenprofiel, diagnostisch (lipidenprofiel + Apo-B)
-
-
- Lithium
-
-
- Magnesium
-
-
- Methylmalonzuur
-
-
- Natrium
-
-
- NT-proBNP
-
-
- PSA, indien afw. vrij PSA (4-10 µg/l)
-
-
- hs Troponine T

Indien verhoogd doorbellen op 06.....(8)

-
- Urinezuur
-
-
- Ureum
-
-
- Vitamine B1
-
-
- Vitamine B12, actief
-
-
- Vitamine B12, actief (indien afw. Methylmalonzuur)
-
-
- Vitamine B6
-
-
- Vitamine D

HEMATOLOGIE

-
- Hb
-
-
- Hb, Ht, erythrocyten, indices
-
-
- Hb, MCV, indien afw. vervolgonderzoek
-
-
- Hb typering (abn. Hb/thalassemie)
-
-
- Reticulocyten

-
- Leukocyten totaal
-
-
- Leukocyten totaal, neutrofielen
-
-
- Leukocyten totaal, differentiatie
-
-
- Eosinofiele granulocyten
-
-
- Trombocyten
-
-
- Bloedgroep/Rhesus/irregulaire antistoffen
-
- Malaria (zie aanvraagformulier malariadiagnostiek, niet op prikpost)*

STOLLINGSONDERZOEK

-
- APTT screening
-
-
- PT screening
-
-
- PT-INR (indien coumarine gebruik)
-
-
- Fibrinogeen
-
-
- Factor V Leiden
-
-
- Trombofilie onderzoek

ENDOCRINOLOGIE

-
- Cortisol (in serum)
-
-
- TSH
-
-
- ft4
-
-
- anti-Mullerian Hormoon (AMH)
-
-
- FSH
-
-
- LH
-
-
- hCG
-
-
- Oestradiol
-
-
- Progesteron
-
-
- Prolactine
-
-
- PTH
-
-
- Testosteron

IMMUNOLOGIE/ALLERGIE

-
- anti-tTG, IgA
-
-
- anti-TPO

-
- anti-TSH receptor antistoffen
-
-
- ANA
-
-
- RA - anti-CCP (5)
-
-
- RA - Reumafactor
-
-
- HLA-B27
-
-
- Hepatitis B (vaccinatie controle)
-
-
- M-proteïne
-
-
- Immunoglobuline (IgA, IgG, IgM)
-
-
- IgE
-
-
- Coeliakie screening familie 1e graad (HLA-DQ2/-DQ8, indien aanwezig: serologie)
-
-
- Allergieonderzoek, Inhalatie screening (4)
-
-
- Allergieonderzoek, specifieke allergenen:

ONDERZOEKEN IN URINE

- (verzamel materiaal halen bij prikposten)
-
- Kreatinine klaring per 24 uur (7)
-
-
- Albumine / kreatinine ratio (urineportie) (6)
-
-
- Totaal eiwit per 24 uur (7)
-
-
- Urinescreening
-
-
- Urinesediment (cilinders) (3)

ONDERZOEKEN IN FECES

- (verzamel materiaal halen bij prikposten)
-
- Calprotectine
-
-
- iFOBT
-
-
- Elastase

DONORONDERZOEK

-
- Nazorg aan altruïstische donor

TOELICHTING

- (1) Op geleide van Hb en MCV wordt gericht aanvullend onderzoek gedaan, tenminste:
Microcytair: ferritine, zo nodig Hb-typering
Normocytair: ferritine, leucocyten, trombocyten, reticulocyten, LD, kreatinine, ijzerstatus
Macrocytair: foliumzuur, actief vit B12, reticulocyten, LD, leucocyten, trombocyten
- (2) eGFR = geschatte GFR berekend mbv CKD-EPI formule op basis van plasma kreatinine
- (3) Beperkt stabiel: alleen in verse geproduceerde urine op poli bloedafname MST of ZGT mogelijk
- (4) Indien pos., uitsplitsing in: Huisstofmijt, Kattenepitheel/roos, Hondenroos, Handjesgras, Timoteegras, Penicillium notatum, Alternaria tenuis, Ruwe berk, Japanse ceder, Alsem ambrosia, Smalle weegbree, Groot glaskruid
- (5) De specificiteit van anti-CCP is aanmerkelijk beter bij een sensitiviteit vergelijkbaar met Reumafactor. Bij verdenking RA is verwijzing geïndiceerd.
- (6) Urineportie: Bij voorkeur direct na het opstaan eerst een kleine hoeveelheid uitplassen, dan een deel opvangen in een urinepotje. Voor nieuwe urinepotjes kunt u terecht bij uw arts of een van onze locaties bloedafname; www.unilabs.nl

- (7) 24 uren urine: Voor het verzamelen van 24 uren urine kan een urinebokaal en instructie worden opgehaald bij een van onze locaties bloedafname; www.unilabs.nl
- (8) Conform de regionale werkafspraken dient een aanvraag van troponine altijd gepaard te gaan met een bereikbaar 06 nummer om afwijkende resultaten door te bellen.

Nuchter: Vanaf 22.00 uur niet meer eten en drinken, behalve water en medicijnen. Diabeten volgens voorschrift van uw arts. Na bloedafname mag u weer eten.

Lichaamsmateriaal dat na analyse overblijft kan voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. Dit gebeurt op anonieme wijze, dat wil zeggen dat niet meer kan worden nagegaan van wie het materiaal afkomstig is. Indien u bezwaar heeft tegen het nader gebruik van lichaamsmateriaal, kunt u dit melden bij de laboratoriummedewerker.

RELEVANTE KLINISCHE GEGEVENS EN OPMERKINGEN

	M-code
--	--------