

Naam van de patiënt (**LET OP!** Ponsplaatje of identiteitsbewijs meenemen)

Naam patiënt en Voorletters:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Sleuteladres:

BSN nummer:



DOOR ARTS IN TE VULLEN

Naam arts

Specialisme

Telefoon

Datum

Zie voor openingstijden trombosedienst www.medlon.nl

Postbus 50 000 Tel 088 - 463 33 00
7500 KA Enschede Fax 088 - 463 33 01
trombosedienst@medlon.nl

ANTISTOLLINGSINDICATIE / NIVEAU

Antistollingsindicatie (voor omschrijving z.o.z.)

(altijd invullen)

Reden van opname

Indicatie na opname gewijzigd? ☐ Ja ☐ Nee

Intensiteitsgroep van voor opname gewijzigd? ☐ Ja ☐ Nee

Indien u **geen nadere aanwijzingen** geeft, wordt het antistollingsniveau (intensiteitsgroep) gehanteerd, die door de Federatie van Nederlandse Trombosediensten bij betreffende indicatie is vastgesteld (z.o.z.).

Afwijkend antistollingsniveau

Reden

GEWENSTE BEHANDELINGSDUUR

☐ 6 weken ☐ 1 jaar

☐ 3 maanden ☐ levenslang

☐ 6 maanden ☐ anders

Automatisch staken ☐ Ja ☐ Nee

(bij nee zal er t.z.t. navraag volgen)

Datum staken

Handtekening arts

(handtekening verplicht)

Is thuisbezoek medisch noodzakelijk? (geen vervoer is geen medische indicatie)

☐ Nee

☐ Ja, tot wanneer?

Reden

DOSERINGSGEGEVENS REEDS GEGEVEN EN VOORGESCHREVEN ANTICOAGULANTIA EN OVERIGE MEDICATIE

☐ Acenocoumarol ☐ Fenprocoumon ☐ Marcoumar ☐

Datum														
INR														
Aantal tabletten														

(LMW) Heparine ☐ Nee ☐ Ja, startdatum einddatum gewicht kg
naam dosering
LMWH staken bij een INR van
Trombocytenaggregatierepressoren ☐ Ja, welke tot wanneer
Overige medicatie

RISICO VERHOEGENDE FACTOREN

☐ verhoogde bloedingsneiging ☐ nierinsufficiëntie ☐ diabetische retinopathie met bloedingen en/of neovascularisatie
☐ malabsorptie syndroom ☐ wisselende mate van hartfalen ☐ overige
☐ maligniteit nl: ☐ (recent) bloedende laesie in de tractus digestivus
☐ onvoldoende geregelde hypertensie ☐ leverinsufficiëntie
☐ recente intracerebrale bloeding

☐ zwangerschap, vermoedelijke bevallingsdatum

De scope van Medlons
accreditatie is gepubliceerd
op www.rva.nl



HUISARTSENLABORATORIA
TROMBOSEDIENTEN
ZIEKENHUISLABORATORIA

M-code

Sneller > Beter > Dichterbij



Ter informatie

ANTISTOLLINGSINDICATIES MET BIJBEHORENDE INTENSITEITSGROEP VOLGENS DE FEDERATIE VAN NEDERLANDSE TROMBOSEDIENSTEN

1e intensiteitsgroep 2.0 - 3.0 INR

2e intensiteitsgroep 2.5 - 3.5 INR

HOOFDGROEP	INDICATIE	INTENSITEIT
Atriumfibrilleren (AF)	AF + (cerebrale) embolie, of hartfalen of reumatische mitralisklepstenose	1
	AF + reumatische mitralisklepstenose + recidief systemische embolie tijdens antistolling	1
	AF + stent bij acuut coronair syndroom	1
	AF, CHA ₂ DS ₂ -VASc Score ≥ 1	1
Bioklepprothese en overig hartchirurgie	Bioklepprothese + Risicofactor [*]	1
	Bioklepprothese in mitralispositie	1
	Mitralishartklepreconstructie	1
	Reumatische mitralishartklepstenose + voorgeschiedenis systemische embolie of breed linker atrium >55mm	1
Cardiomyopathie (EF <35 %) in bijzondere gevallen	Cardiomyopathie + Aneurysma cordis	1
	Cardiomyopathie + intra-cardiale trombus	2
Cerebrale embolie bijzondere gevallen	Cryptogene cerebrale embolie tijdens acetylsalicylzuur of clopidogrel bij PFO, of aneurysma atriumseptum	1
Kunstklep	Mechanische aortahartklepprothese Type Plaats	1
	Mechanische aortahartklepprothese + risicofactor Type Plaats	2
	Mechanische hartklepprothese ongeacht positie + systemische embolie tijdens adequate antistolling Type Plaats	2
	Mechanische hartklepprothese oude generatie ongeacht positie Type Plaats	2
	Mechanische mitralis, tricuspidalis of pulmonalis hartklepprothese Type Plaats	2
	Mechanische mitralis, tricuspidalis of pulmonalis hartklepprothese+risicofactor Type Plaats	2
Overige (zeldzame) indicaties	Overige (zeldzame) indicaties	1
	(Recidiverende) Tromboflebitis	1
Perifeer arterieel vaatlijden in bijzondere gevallen	Perifere arteriële embolie zonder AF	1
	Veneuze bypass	1
Primaire Veneuze Trombo Embolie	Eerste DVT arm	1
	Eerste DVT been/bekken	1
	Eerste DVT overige locaties	1
	Eerste Longembolie	1
Pulmonale hypertensie	Pulmonale hypertensie	1
Recidief Veneuze Trombo Embolie	Recidief Longembolie en DVT bij adequate cumarinetherapie	2
	Recidief Longembolie en DVT zonder adequate cumarinetherapie	1

^{*} Risicofactor: vergroot atrium, of voorgeschiedenis systemische embolie of myocard infarct of lage ejectiefractie of atriumfibrilleren.